

# 乳幼児期の予防接種の受け方

◆岩出市では、乳幼児の予防接種を受ける方法は、すべて「個別接種」になります。  
保護者の方が直接医療機関に予約し、接種してください。

◆持参するもの： 予診票 ・ 母子健康手帳 ・ 健康保険証

◆ 乳幼児予防接種の種類と回数、接種期間

| 予防接種の種類                                   |   | 接種回数(標準的な間隔)   | 接種可能年齢             | 標準的な接種期間                         |
|---|---|--|--------------------|----------------------------------|
| ロタ  | 5価<br>(ロタテック)   | 3回 (27日以上の間隔をあけて)  | 生後6週～32週まで         | 初回接種は生後2か月～生後14週6日まで 2回目以上は32週まで |
|   | 1価<br>(ロタリックス)  | 2回 (27日以上の間隔をあけて)  | 生後6週～24週まで         | 初回接種は生後2か月～生後14週6日まで 2回目は24週まで   |
| B型肝炎                                      | 初回  | 2回 (27日以上の間隔をあけて)  | 生後～1歳未満            | 2か月～9か月未満                        |
|   | 追加  | 1回 (第一回目の接種から139日以上の間隔をあけて)  |                    |                                  |
| ヒブ  | 初回  | 3回 (27日以上、標準的には27～56日までの間隔をあけて) (ただし、2回目、3回目は1歳を超えた場合は接種しない)                 | 2か月～5歳未満           | 2か月～7か月未満                        |
|   | 追加  | 1回(初回接種終了後7か月以上、標準的には7か月～13か月までの間隔をあけて)                                      |                    | (初回終了後7か月～13か月の間隔をあけて接種)         |
|   | (接種もれスケジュール①) 7か月～1歳未満で受け始める場合                          |  | 2か月～5歳未満           | ※標準的な接種年齢を超えて接種する場合は、接種回数が異なります。 |
|   | 初回  | 2回(27日以上、標準的には27～56日までの間隔をあけて) (ただし、2回目は1歳を超えた場合は接種しない)                      |                    |                                  |
|   | 追加  | 1回(初回終了後7か月以上、標準的には7か月～13か月までの間隔をあけて)  |                    |                                  |
| (接種もれスケジュール②) 1歳以上5歳未満で受け始める場合<br>接種回数:1回 |   |  |                    |                                  |
| 小児肺炎球菌                                    | 初回  | 3回(標準的には1歳までに、27日以上の間隔をあけて)<br><br>(2回目3回目は2歳まで。また、2回目が1歳を超えた場合は3回目は接種しません。) | 2か月～5歳未満           | 2か月～7か月未満                        |
|   | 追加  | 1回(初回接種終了後60日以上の間隔をあけた後であって、1歳に達してから)  | 1歳～5歳未満            | 1歳～1歳3か月未満                       |
|   | (接種もれスケジュール①) 7か月～1歳未満で受け始める場合                          |  | 2か月～5歳未満           | ※標準的な接種年齢を超えて接種する場合は、接種回数が異なります。 |
|   | 初回  | 2回(標準的には1歳までに、27日以上の間隔をあけて) (ただし、2回目は2歳まで)                                   |                    |                                  |
|   | 追加  | 1回(1歳以上で初回接種終了後60日以上の間隔をあけて)   |                    |                                  |
|   | (接種もれスケジュール②) 1歳以上2歳未満で受け始める場合<br>接種回数:2回(60日以上の間隔をあけて) |  |                    |                                  |
| (接種もれスケジュール③) 2歳以上5歳未満で受け始める場合<br>接種回数:1回 |   |  |                    |                                  |
| DPT-IPV<br>(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)<br>4種混合   | 初回  | 3回 (20～56日までの間隔をあけて)   | 3か月～7歳半未満          | 3か月～1歳未満                         |
|   | 追加  | 1回 (初回接種終了後6か月以上の間隔をあけて)   |                    | (初回接種終了後1年～1年半後)                 |
| BCG                                       |   | 1回   | 生後～1歳未満            | 5か月～8か月未満                        |
| MR<br>(麻しん・風しん)<br>混合                     | 1期  | 1回   | 1歳～2歳未満            | 1歳～2歳未満                          |
|   | 2期  | 1回   | 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間 | 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間               |
| 水痘  |   | 2回 (3か月以上の間隔をあけて)  | 1歳～3歳未満            | 生後12か月～15か月未満で初回、その6か月～12か月後に2回目 |
| 日本脳炎<br>I期                                | 初回  | 2回 (6～28日までの間隔をあけて)  | 6か月～7歳半未満          | 3歳～4歳未満                          |
|   | 追加  | 1回 (初回接種終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて)  |                    | 4歳～5歳未満                          |