

乳幼児期の予防接種の受け方

◆岩出市では、予防接種を受ける方法はすべて「個別接種」になります。

保護者が直接医療機関に予約し、接種してください。

◆持参するもの： 予診票(デジタルまたは紙) ・ 母子健康手帳 ・ マイナ保険証または資格確認書

乳幼児予防接種の種類と回数、接種期間

予防接種の種類		接種回数(標準的な間隔)	接種可能年齢	標準的な接種期間
ロタウイルス 感染症	1価 (ロタリックス)	2回 (27日以上の間隔をあけて)	出生6週0日後～24週0日後まで	初回接種は生後2か月～出生14週6日後まで 2回目は24週0日後まで
	5価 (ロタテック)	3回 (27日以上の間隔をあけて)	生後6週0日後～32週0日後まで	初回接種は生後2か月～出生14週6日後まで 2回目以上は32週0日後まで
B型肝炎	初回	2回 (27日以上の間隔をあけて)	生後～1歳未満	2か月～9か月未満
	追加	1回 (第一回目の接種から139日以上の間隔をあけて)		
小児 肺炎球菌	初回	3回(標準的には1歳までに、27日以上の間隔をあけて) (2回目3回目は2歳まで。また、2回目が1歳を超えた場合は3回目は接種しません。)	2か月～5歳未満	2か月～7か月未満
	追加	1回(初回接種終了後60日以上の間隔をあけた後であって、1歳に達してから)	1歳～5歳未満	1歳～1歳3か月未満
	初回	2回(標準的には1歳までに、27日以上の間隔をあけて) (ただし、2回目は2歳まで)	※標準的な接種年齢を超えて接種する場合は、接種回数が異なります。	
	追加	1回(1歳以上で初回接種終了後60日以上の間隔をあけて)		
	〈接種もれスケジュール①〉 7か月～1歳未満で受け始める場合 接種回数:2回(60日以上の間隔をあけて)			
〈接種もれスケジュール②〉 1歳以上2歳未満で受け始める場合 接種回数:2回(60日以上の間隔をあけて)				
〈接種もれスケジュール③〉 2歳以上5歳未満で受け始める場合 接種回数:1回				
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	初回	3回 (20日以上の間隔をあけて)	2か月～7歳半未満	2か月～1歳未満
	追加	1回 (初回接種終了後6か月以上の間隔をあけて)		(初回接種終了後6か月～1年半後)
BCG		1回	生後～1歳未満	5か月～8か月未満
MR (麻しん・風しん) 混合	1期	1回	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満
	2期	1回	5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間
水痘		2回 (3か月以上の間隔をあけて)	1歳～3歳未満	生後12か月～15か月未満で初回、その6か月～12か月後に2回目
日本脳炎 I期	初回	2回 (6～28日までの間隔をあけて)	6か月～7歳半未満	3歳～4歳未満
	追加	1回 (初回接種終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて)		4歳～5歳未満